

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
醫門法律卷十一

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣盧遂

謄錄貢生臣畢所謫

欽定四庫全書

醫門法律卷十一

南昌喻昌撰

消渴門

論二首
律五條

法四條

消渴論

喻昌曰消渴之患常始於微而成於著始於胃而極於肺腎始如以水沃焦水入猶能消之既而以水投石水去而石自若至於飲一溲一飲一溲二則燥火劫其真

陰操立盡之術而勢成燭燭矣內經有其論無其治金匱有論有治矣而集書者採傷寒論厥陰經消渴之文湊入後人不能決擇斯亦不適於用也蓋傷寒傳經熱邪至厥陰而盡熱勢入深故渴而消水及熱解則不渴且不消矣豈雜證積漸為患之比乎謹從內經擬議言之經謂凡治消瘴仆繫偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏粱之疾也比中消所由來也肥而不貴食弗給於鮮貴而不肥食弗過於饕肥而且貴醇酒厚味孰為限量

哉久之食飲釀成內熱津液乾涸求濟於水然水入尚能消之也愈消愈渴其膏粱愈無已而中消之病遂成矣夫既痺成為消中隨其或上或下火熱熾盛之區以次傳入矣上消者胃以其熱上輸於肺而子受母累心復以其熱移之於肺而金受火刑金者生水而出高源者也飲入胃中遊溢精氣而上則肺通調水道而下今火熱入之高源之水為暴虐所逼合外飲之水建瓶而下飲一澍二不但不能消外水且並素醞水精竭絕而

盡輸於下較大腑之暴注暴泄尤為甚矣故死不治也
所謂由心之肺謂之死陰死陰之屬不過三日而死者
此之謂也故飲一溲二第一危候也至於胃以其熱由
關門下傳於腎腎或以石藥耗其真女謁竭其精者陽
強於外陰不內守而小溲渾濁如膏飲一溲一腎消之
證成矣經謂石藥之性悍又謂脾風傳之腎名曰疝瘕
少腹冤熱而痛出白液名曰蠱明指腎消為言醫和有
云女子陽物也晦淫則生內熱惑蠱之疾此解冤熱及

盡義甚明王太僕謂消爍肌肉如蠱之蝕日漸損削乃從消字起見淺矣淺矣夫惑女色以喪志精泄無度以至水液渾濁反從火化亦最危候經云君火之下陰精承之故陰精有餘足以上承心火則其人壽陰精不足心火直下腎中陽精所降其人夭矣故腎者胃之關也關門不開則水無輸泄而為腫滿關門不閉則水無底止而為消渴消渴屬腎一證金匱原文未脫其曰飲一斗溲一斗者腎氣丸主之於以蒸動精水上承君火而

止其下入之陽光此正通天手眼張子和輒敢詆之既詆仲景復諛河間謂其神芎丸以黃芩味苦入心牽牛大黃驅火氣而下以滑石引入腎經將離入坎真得黃庭之祕顛倒其說阿私所好識趣卑陋若此又何足以入仲景之門哉何栢齋消渴論中已辨其非昌觀戴人吐下諸案中從無有治消渴一案者可見無其事即無其理矣篇首論火一段非不有其理也然以承氣治壯火之理施之消渴又無其事矣故下消之火水中之火

也下之則愈燔中消之火竭澤之火也下之則愈傷上
消之火燎原之火也水從天降可滅徒攻腸胃無益反
損夫地氣上為雲然後天氣下為雨是故雨出地氣地
氣不上天能雨乎故亟升地氣以慰三農與亟升胃氣
以溉三焦皆事理之必然者耳不與昔賢一為分辨後
人亦安能行其所明哉

消渴續論

昌著消渴論聊會內經大意謂始於胃而極於肺腎定

為中上下之三消其他膈消食停等證要亦中上之消耳然未得金匱之實據心恒不慊越二歲忽憶內經云有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行胃氣熱熱氣薰胸中故內熱恍然悟胸中受病消息惟是胃中水穀之氣與胸中天真灌注環周乃得清明在躬若有所勞倦傷其大氣宗氣則胸中之氣衰少胃中穀氣因而不盛穀氣不盛胸中所傷之氣愈益難復而不能以克行於是穀氣留於胃中胃中鬱而為熱熱氣薰入胸中混

合其衰少之氣變為內熱胸胃間不覺易其沖和之舊
矣求其不消不渴寧可得乎透此一關讀金匱所不了
了者今始明之其云寸口脈浮而遲浮即為虛遲即為
勞虛則衛氣不足勞則榮氣竭趺陽脈浮而數浮則為
氣數則消穀而大堅氣盛則溲數溲數則堅堅數相搏
即為消渴舉寸口以候胸中之氣舉趺陽以候胃中之
氣顯然有脈之可循顯然有證之可察然且難解其微
焉蓋陰在內為陽之守陽在外為陰之固寸口脈浮陰

不內守故衛外之陽浮即為虛也寸口脈遲陽不外固故內守之陰遲即為勞也總因勞傷榮衛致寸口脈虛而遲也然榮者水穀之精氣衛者水穀之悍氣虛而且遲水穀之氣不上克而內鬱已見膈虛胃熱之一斑矣更參以趺陽脈之浮數浮則為氣即內經熱氣薰胸中之變文數則消穀而大堅昌前論中既如以水投石水去而石自若偶合胃中大堅消穀不消水之象可見火熱本足消水也水入本足救渴也胃中堅燥全不受水

之浸潤轉從火熱之勢急奔膀胱故洩數洩去其內愈燥所以堅數相搏即為消渴直引內經味過於苦久從火化脾氣不濡胃氣乃厚之意為消渴之源精矣微矣晉唐以後代不乏賢隨其聰敏揣摩內經各自名家卒皆不入仲景堂與其所得於內經者淺耳使深則能隨證比類各出脈證方治以昭成法而金匱遺編家傳戶誦之矣即如消渴證相沿謂中消者宜下之共守一語更無別商豈一下可了其局乎抑陸續徐下之乎夫胃

已大堅不受膏沐輒投承氣堅者不受瑕者受之矣膀胱不受大腸受之矣豈不乘其藥勢傳為痢下驚澹中滿腫脹之證乎總錄謂未傳能食者必發腦疽背瘡不能食者必傳中滿鼓脹皆為不治之證諸家不亟亟於始傳中傳反於未傳多方療治如忍冬藍葉薺芫丸散及紫蘇葶蘆中滿分消湯丸欲何為耶金匱於小溲微覺不利蚤用文蛤一味治之方書從不錄用詎知軟堅之品非劫陰即傷陰獨此一種平善無過兼可利水

誠足寶乎潔古謂能食而渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢氏白朮散加葛根末傳瘡疽者火邪盛也急攻其陽無攻其陰下焦元氣得强者生失强者死末傳中滿者高消中消制之太過速過病所上熱未除中寒復起非藥之罪用藥時失其緩急之制也潔古老人可謂空谷足音矣所云無攻其陰得强者生失强者死皆慮泉竭之微言令人聳然起敬於是追步後塵徐商一語曰三消總為火病豈待末傳瘡疽始為火邪勝耶然

火之在陽在陰分何藏府合何藏府宜升宜降宜折宜
伏各各不同從其性而治之使不相扞格乃為良法若
不治其火但治其熱火無所歸熱寧有止耶如腎消陰
病用六味丸陽病用八味丸此亦一法若謂下消只此
一法其去中消宜下之說能以寸哉

內經陰陽別論曰二陽結謂之消二陽者陽明也手陽
明大腸主津病消則目黃口乾是津不足也足陽明
胃主血病熱則消穀善饑血中伏火乃血不足也結

者津血不足結而不行皆燥之為病也

內經曰心移熱於肺傳為膈消張子和謂膈消猶未及於肺至心移寒於肺乃為肺消如此泥文害意非能讀內經者也豈有心移熱於肺肺傳其熱於膈猶未及肺之理必變經文為心移熱於膈傳為肺消乃不泥乎要識心肺同居膈上肺為嬌藏移寒移熱總之易入但寒邪入而外束熱邪入而外傳均一肺消而治則有分矣

劉河間論三消之疾本濕寒之陰氣極衰燥熱之陽氣太甚六氣中已遺風火二氣矣且以消渴消中消腎分名三消豈中下二消無渴可言耶及引經言有心肺氣厥而渴有肝痺而渴有痺熱而渴有胃與大腸結熱而渴有脾痺而渴有腎熱而渴有小腸痺熱而渴愈推愈泛其不合論消渴但舉渴之一端為燥熱亡液之驗誠不可解王機微義深取其說發煖藥補腎之誤吾不知煖藥果為何藥也世豈有以煖藥治

消渴之理哉其意蓋在非金匱之主腎氣丸耳夫腎氣丸蒸動腎水為治消渴之聖藥後世咸知之而何栢齋復辨之昌恐後學偶閱子和宗厚之說反滋疑眩故再陳之

痺成為消中胃熱極深胃火極熾以故能食易饑多渴諸家咸謂宜用大承氣湯下之矣不知漸積之熱素蘊之火無取急下之亦不去徒損腸胃轉增其困耳故不得已而用大黃當久蒸以和其性更不可合

枳實厚朴同用助其疾趨之勢潔古用本方更其名曰順利散隱然取順利不取攻劫之意方下云治中消熱在胃而能食小便赤黃微利至不欲食為効不可多利昌恐微利至不欲食胃氣已不存矣承氣非微利之法而可瀆用哉子和更其方為加減三黃丸合大黃芩連用之不用枳朴矣方下云治丹石毒及熱渴以意測度須大實者方用曾不思消渴證真氣為熱火所耗幾見有大實之人耶然則欲除胃中火

熱必如之何而後可昌謂久蒸大黃與甘草合用則
急緩互調與人參合用則攻補兼施如克國之屯田
金城坐困先零庶幾可圖三年之艾目前縱有乘機
鬪捷之著在所不舉如之何欲取効眉睫耶昔賢過
矣

律五條

凡治初得消渴病不急生津補水降火徹熱用藥無當
遷延誤人醫之罪也

凡治中消病成不急救金水二藏泉之竭矣不云自中醫之罪也

凡治肺消病而以地黃丸治其血分腎消病而以白虎湯治其氣分執一不通病不能除醫之罪也

凡消渴病少愈不亟回枯澤槁聽其土燥不生致釀瘡疽無救醫之罪也

凡治消渴病用寒涼大過乃至水勝火湮猶不知反漸成腫滿不救醫之罪也

消渴門諸方

金匱腎氣丸 本文云男子消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣丸主之即崔氏八味丸治脚氣上入少腹不仁之方也

乾地黄

兩八

山茱萸

山藥

兩各四

澤瀉

白茯苓

牡丹皮

兩各三

肉桂

附子

一兩炮各

右八味末之煉蜜為丸梧子大酒下十五丸日再服

按王太僕註內經云火自腎而起謂龍火龍火當

以火逐火則火可滅若以水治火則火愈熾此必然之理也昌更謂用桂附蒸動腎水開闔胃關為治消渴喫緊大法胡乃張子和別有肺腸前論中已詳之矣但至理難明淺見易惑局方變其名為加減八味丸加五味子一兩半減去附子豈非以五味之津潤勝於附子之燥熱耶舉世咸樂宗之大惑不解可奈何哉

金匱文蛤散

本文云渴欲飲水不止者文蛤散主

之

文蛤五兩

右一味杵為散以沸湯五合和服方寸匙

按傷寒論用此治悞以水噉人面肌膚粟起之表證
今消渴裏證亦用之蓋取其功擅軟堅且利水徹熱
耳前已論悉

再按金匱治消渴止用腎氣丸五苓散文蛤散三方
而五苓又從傷寒證中採入白虎加人參湯亦然所

以用方者當會通全書而引伸以求其當也

金匱白虎加人參湯 原治太陽中暍汗出惡寒身

熱而渴 去知母之苦加淡竹葉麥門冬之甘名

竹葉石膏湯治虛煩證

知母

六兩

石膏

一斤碎

甘草

三兩

粳米

六合

人參

二兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

按此治火熱傷其肺胃清熱救渴之良劑也故消渴

病之在上焦者必取用之東垣以治膈消潔古以治
能食而渴者其不能食而渴者用錢氏白朮散倍加
葛根而東垣復參內經膏粱之病不可服芳草石藥
治之以蘭除其陳氣之義一變其方為蘭香飲子用
石膏知母生熟甘草人參加入蘭香防風白芷薏仁
連翹桔梗升麻半夏再變其方為生津甘露飲子用
石膏人參生熟甘草知母加黃蘗杏仁山梔葶澄茄
白葵白芷薏仁白芷連翹薑黃麥門冬蘭香當歸身桔

梗升麻黃連木香柴胡藿香全蝎而為之辭曰此制之緩也不惟不成中滿亦不傳下消矣三消皆可用昌實不敢信其然也乃至三因之石子蘆花湯潔古之清涼飲子俱從此方增入他藥引入他藏全失急救肺胃之意此後賢之所以為後賢耶

竹葉黃芪湯 治消渴證氣血虛胃火盛而作渴

淡竹葉 生地黃 各二錢 黃芪 麥門冬 當歸

川芎 黃芩 炒 甘草 芍藥 人參 半夏 石

膏

煨各
一錢

右水煎服

按前白虎加人參湯專治氣分燥熱此方兼治氣血燥熱後一方專治血分燥熱宜辨證而擇用之

生地黃飲子 治消渴咽乾面赤煩燥

人參 生乾地黃 熟乾地黃 黃芪 天門冬

麥門冬 枳殼麩炒 石斛 枇杷葉 澤瀉 甘

草

炙各
等分

右剉散每服三錢水一盞煎至六分去滓食遠臨卧
頓服 此方生精補血潤燥止渴佐以澤瀉枳殼疎
導二腑使心火下降則小腑清利肺經潤澤則大腑
流暢宿熱既除其渴自止故取用之

錢氏白朮散 治虛熱而渴

人參 白朮 白茯苓 甘草 藿香 木香

各一

兩 乾葛 二兩

右為末每服三錢水煎溫服如飲水多多與服之

按仁齋用本方加五味子柴胡各三錢分十劑煎服
治消渴不能食海藏云此四君子加減法亦治濕勝
氣脫泄利太過故虛熱作濕在所必用

宣明黃芪湯 治心移寒於肺為肺消飲少澁多當

補肺平心

黃芪

三兩

五味子

人參

麥門冬

桑白皮

各二兩

枸杞子

熟地黃

各一兩半

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

宣明麥門冬飲子 治心移熱於肺傳為膈消胸滿

心煩精神短少

人參 茯神 麥門冬 五味子 生地黃 炙

甘草 知母 葛根 括萎根

各等分

右㕮咀每服五錢加竹葉十四片煎七分溫服無時
按宣明二方為內經心移寒移熱兩證各出其治一
種苦心非不可嘉然移寒移熱其勢頗銳而生津養
血其應差緩情非的對易老門冬飲子亦然昌謂心

之移寒必先束肺之外郭用參芪補肺加散寒之藥可也而用枸杞熟地黃補腎則迂矣用桑白皮瀉肺其如外束之寒何至心之移熱治以鹹寒先入其心如文蛤散之類自無熱可移正直走大梁解圍之上者何不及之所以觀於海者難為水也

易老門冬飲子 治老弱虛人大渴

人參 枸杞子 白茯苓 甘草 各等分 五味子

麥門冬 各半兩

右薑水煎服

按易老方即變宣明麥冬飲子去生地知母葛根加
枸杞也方下不言心移熱於肺惟以治老弱虛人大
渴而增枸杞之潤去地黃之泥知母之苦葛根之發
立方於無過治本之圖不為迂矣

猪肚丸 治強中消渴

黃連 粟米 括萎根 茯神 知母 麥門

各四兩

冬 各二兩

右為細末將大猪肚一箇洗淨入末藥於內以麻線縫合口置甑中炊極爛取出藥別研以猪肚為膏再入煉蜜搜和前藥杵勻丸如梧子大每服五十九參湯下又方加人參熟地黄乾葛又方除知母粟米用小麥

爛金丸

治熱中消渴止後補精血益諸虛解勞倦

去骨節間熱寧心強志安神定魄固臟腑進飲食

免生瘡瘍

大猪肚

一箇

黃連

三兩

生薑

碎

白蜜

各二兩

二

先將猪肚淨洗控乾復以蔥椒醋麵等同藥以水酒入銀石器內煮半日漉出黃連洗去蜜酒令盡剉研為細末再用水調為膏入猪肚內以線縫定仍入銀石器內煮爛研如泥搜和下項藥

人參 五味子

杜仲

薑炒

山藥

去絲

石斛

山茱

肉 車前子

新蓮肉

去皮

鱉甲

醋炙

乾地黄

當

歸

各二兩

磁石

煨

白茯苓

槐角子

炒

川芎

各一兩

黃

芪

四兩

兔絲子

酒淘蒸
研五兩

沈香

半兩

麝香

別研
一錢

右為細末用猪肚膏搜和得所如膏少添熟蜜搗數
千杵丸如桐子大每服五十丸食前用溫酒或糯米
飲送下一方有白朮二兩陽起石一兩

按用麝香陽起石開竅興陽渾是後人孟浪知見其
他無過之藥及製壯之法亦有可採故合前方兩存
之

潔古化水丹 治手足少陰渴飲水不止或心痛者

本事治飲冷水多

川烏

臍大者四枚炮去皮

甘草

炙一兩

牡蠣

生三兩

蛤粉

用厚者炮四兩

右為細末醋浸蒸餅為丸每服十五丸新汲水下心痛者醋湯下立愈飲水一石者一服愈海藏云此藥能化停水

按飲水過多亦有能消其火熱者而火熱既消反不能消水轉成大患者多有之潔古有見於此而用川烏助火合之牡蠣蛤粉鹹寒共成消水之功也又恐

纔過之火熱其根尚伏所以不多用之原有深意但不和盤托出以告人耳

黃連膏 治口舌乾小便數舌上赤脈生津液除乾

燥長肌肉

黃連

一斤礮為末

牛乳汁

白蓮藕汁

生地黄汁

各一斤

斤

右將汁熬膏搓黃連末為丸如小豆大每服二十丸

少呷湯下日進十服

生地黄膏 治證同前

生地黄

掬大一握

冬蜜

一人參兩半

白茯苓

右先將地黄洗搥爛以新汲水調開同蜜煎至一半入參苓末拌和以磁器密收匙挑服

按二膏一用苦寒合甘寒一純用甘寒相其所宜擇而用之治消渴之權衡大畧可推故兩錄之

天門冬丸 治初得消中食已如饑手足煩熱背膊疼悶小便白濁

天門冬

土瓜根

乾者

瓜蒌根

熟地黃

知母

焙

肉蓯蓉

酒浸一宿切焙

鹿茸

五味子

赤石脂

澤瀉

各一兩半

雞內金

三具微炙

桑螵蛸

十枚炙

牡蠣

煨二兩

苦參

一兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服二十九丸用粟米飲送下食前

按初得中下二消急治其本可也丸藥本緩且只服二十九丸未免悠悠從事矣方中藥品頗佳但赤石脂有可議耳減去此物更增三倍用之可以必効蓋初

起之易為功也

猪腎薺芩湯 治消中日夜尿八九升者

猪腎

二具

大豆

一斤

薺芩

石膏

各三兩

人參

茯苓

一作

茯苓

知母

葛根

黃芩

磁石

綿裹

瓜蒌根

甘草

各二兩

右㕮咀用水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗去滓
下藥煮取三升分作三服渴急飲之下焦熱者夜輒
服一劑渴止勿服

按此方用白虎等清涼之劑加入猪腎大豆磁石引諸清涼入腎且急服之火熱熾盛於上下三焦者在所必用後有製薺芩丸治強中為病莖長興盛不交精益消渴之後多作癰疽皆由過服丹石所致即以本方去石膏知母葛根黃芩加鹿茸地骨皮熟地黃沈香以其病在中下陽氣陰精兩竭故舍上焦之清涼而事下焦之溫補為合法也

腎瀝散 治消腎腎氣虛損發渴小便數腰疼痛

雞胫胫

炙微

遠志

去心

人參

桑螵蛸

炒微

黃芪

澤瀉

桂心

熟地黃

白茯苓

龍骨

當歸

各一兩

麥門冬

去心

川芎

各二兩

五味子

炙甘草

玄參

各半

兩

磁石

半兩研碎
淘去赤汁

右判碎每服用羊腎一對切去脂膜先以水一盞半

煮腎至一盞去水上浮脂及腎次入藥五錢生薑半

分煎至五分去滓空心服晚食前再服

按腎氣虛損之證本陰精不足當歸川芎雖云補陰

不能補精且一辛一散非所宜施不若以山茱萸枸杞子代之為長以其引用之法頗佳故取之

白茯苓丸 治腎消因消中之後胃熱入腎消爍腎脂令腎枯燥遂致此疾兩腿漸細腰脚無力

白茯苓 覆盆子 黃連 瓜蒌根 草薢 人

參 熟地黃 玄參 各一兩 石斛 蛇床子 各七錢半 雞

腔脰 三十具 微炒

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧子大每服三

十九食前煎磁石湯送下

友人朱麟生病消渴後渴少止反加燥急足膝痿弱
命予亟以雜霸之藥投之不能待矣予主是丸加犀
角坐中一醫曰腎病而以犀角黃連治其心毋乃倒
乎予曰腎者胃之關也胃之熱下傳於腎則關門大
開關門大開則心之陽火得以直降於腎經云陽精
所降其人天非細故也今病者心火燥腎燥不能需
予用犀角黃連入腎對治其下降之陽光寧為倒乎

醫敬服友人服之果効再更六味地黃丸加犀角而
肌澤病起

忍冬丸 治渴病愈須預防發癰疽

忍冬草

根莖花葉
皆可用之

右用米麴酒於瓶內浸糠火煨一宿取出曬乾入甘
草少許為末既以所浸酒煮糊為丸如梧桐子大每
服五十丸至百丸酒飲任下

按此方於四月間採鮮花十數斤揉取其汁煎成膏

子酒湯任用點服養陰退陽調和榮衛血脈凡係火熱熾盛之體允為服食仙方

藍葉散 治渴利口乾煩熱背生癰疽赤炆疼痛

藍葉 升麻 玄參 麥門冬 黃芪 葛根

沈香 赤芍藥 犀角屑 甘草 生用各一兩 大黃 二兩

微炒

每服四錢水一盞煎至六分去滓不拘時溫服

紫蘇湯 治消渴後遍身浮腫心膈不利

紫蘇莖葉

桑白皮

赤茯苓

各一兩

郁李仁

去皮炒二

兩

羚羊角

鎊

檳榔

各七錢半

桂心

枳殼

麤炒

獨活木

香

各半兩

每服四錢水一盞半生薑半分煎八分溫服

烏梅木瓜湯

治飲酒多發積為酷熱裏蒸五臟津

液枯燥血泣小便併多肌削嗜冷物寒漿

木瓜乾

烏梅

槌破不去仁

麥蘖

炒

甘草

草菓

去皮各半

兩

每服四錢水一盞半薑五片煎七分不拘時服

殺蟲方 治消渴有蟲

苦楝根取新白皮一握切焙入麝香少許水二碗煎至一碗空心飲之雖困頓不妨自後下蟲三四條類虬蟲而色紅其渴頓止乃知消渴一證有蟲

耗其精液

出夷堅志

按飲醇食博積成胃熱濕熱生蟲理固有之不獨消渴一證為然臨病宜加審諦也

虛勞門諸方

金匱桂枝龍骨牡蠣湯

論見前 小品云虛弱浮熱汗出者除桂加白薇附子各

三分故曰二加龍骨湯

桂枝 芍藥 生薑

各三兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

龍骨

牡蠣

右七味以水七升煮取三升分溫三服

金匱天雄散

有論

天雄

三兩炮

白朮

八兩

桂枝

六兩

龍骨

三兩

右四味杵為散酒服半錢匕日三服不知稍增之

金匱小建中湯

有論

桂枝

三兩
去皮

甘草

三兩
炙

大棗

十二
枚

芍藥

六兩

生薑

二兩

膠

飴

一升

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火

消解溫服一升日三服

嘔家不可用建中湯以甜故也

千金療男女因積冷氣滯或大病後不復常苦四肢沈重骨肉痠疼吮吸少氣行動喘乏胸滿氣急腰背強痛心中虛悸咽乾唇燥面體少色或飲食無味脇肋腹張頭重不舉多卧少起甚者積年輕者百日漸

致瘦弱五臟氣竭則難可復常六脈俱不足虛寒乏氣少腹拘急羸瘠百病名曰黃芪建中湯又有人參

二兩

金匱黃耆建中湯

有論於小建中湯內加黃耆一兩半餘依上法氣短胸滿者加

生薑腹滿者去棗加茯苓一兩半及療肺虛損不足補氣加半夏三兩

樂令建中湯 治臟腑虛損身體消瘦潮熱自汗將

成癆瘵此藥大能退虛熱生血氣

前胡

細辛

淨

黃耆

蜜塗炙

人參

桂心

橘皮

去白

當歸

洗去土

白芍藥

茯苓

去皮

麥門冬

去心

甘草

炙

各一兩

半夏

湯洗七次
切七錢半

每服四錢水一盞薑四片棗一枚煎七分不拘時熱服

按樂令建中湯治虛勞發熱以此並建其中之營血蓋營行十二經脈之中為水穀之精氣故建其營血亦得以建中名之耳

十四味建中湯 治營衛失調氣血不足積勞虛損形體羸瘠短氣嗜卧欲成癆瘵

當歸

酒浸
焙

白芍藥

白朮

麥門冬

去心

甘草

炙

肉

茯苓

酒浸

人參

川芎

肉桂

附子

炮

黃耆

製

半夏

熟地黃

酒蒸
焙

茯苓

各等
分

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚空心溫服
按十四味建中湯治臟氣素虛以之兩建其脾腎之
陰陽蓋虛勞病多本脾腎故引伸建中之法以治之
二方乃後人超出之方也

金匱八味腎氣丸

有論

方見前

金匱薯蕷丸 有論

薯蕷 三十分 當歸 桂枝 乾地黄 麴 豆黃卷

各十 甘草 二十分 芎藭 麥門冬 芍藥 白朮

杏仁 各六分 人參 七分 柴胡 桔梗 茯苓 各五分 阿

膠 七分 乾薑 三分 白薇 二分 防風 六分 大棗 百枚 為膏

右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大空腹酒服一
丸一百丸為劑

金匱酸棗仁湯 有論

酸棗仁

升二

甘草

兩一

知母

兩二

茯苓

兩二

芎藭

兩二

深師有生

薑二兩

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煮取三

升分溫三服

金匱大黃廔蟲丸

有論

大黃

十分

黃芩

兩二

甘草

兩三

桃仁

升一

杏仁

升一

芍藥

兩四

乾地黄

兩十

乾漆

兩一

蠱蟲

升一

水蛭

枚百

蟻螬

升一

廔蟲

升半

右十二味末之煉蜜和丸小豆大酒飲服五丸日三

服

金匱附千金翼炙甘草湯

有論

甘草

四兩炙

桂枝

生薑

各三兩

麥門冬

半斤

麻仁

半升

參

阿膠

各二兩

大棗

三十枚

生地黄

一斤

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠消盡溫服一升日三服

金匱附肘後癰肝散

有論

癰肝一具炙乾末之水服方寸匕日三服

十全大補散 治男子婦人諸虛不足五勞七傷不
進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛
夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘嗽中滿脾腎氣
弱五心煩悶並皆治之

肉桂 甘草 芍藥 黃耆 當歸 川芎 人

參 白朮 茯苓 熟地黃

各等分

右為麤末每服二大錢水一盞生薑三片棗二枚煎
至七分不拘時溫服

按此方合黃耆建中湯四君子湯四物湯三方共得
十味合天地之成數名曰十全大補以治氣血俱衰
陰陽並弱之候誠足貴也但肉桂之辛熱未可為君
審其腎虛腰腹痛少用肉桂若營衛之虛須少用桂
枝調之取為佐使可也

聖愈湯 治一切失血或血虛煩渴燥熱睡卧不寧
或瘡證膿水出多五心煩熱作渴等證

熟地黃

生者
自製

生地黃

當歸

酒拌各
一錢

人參

黃芪

炒川芎各一錢

右水煎服

按失血過多久瘡潰膿水不止雖曰陰虛實未有不兼陽虛者合用人參黃耆允為良法凡陰虛證大率宜倣此矣

黑地黃丸 治陽盛陰衰脾胃不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色此補氣益胃之劑也

蒼朮

一斤

油浸熟地黃

一斤

五味子

半斤

乾薑

半斤

秋冬一兩夏兩春七錢

右為細末棗肉丸如梧子大食前米飲或酒服百丸
治血虛久痔甚妙經云腎苦燥急食辛以潤之此藥
開腠理生津液通氣又五味子酸以收之此雖陽盛
而不燥熱乃是五臟虛損於內故可益血收氣此藥
類象神品方也

按此方以蒼朮為君地黃為臣五味子為佐乾薑為
使治脾腎兩臟之虛而去脾濕除腎燥即兩擅其長
超超玄著視後人之脾腎雙補藥品龐雜者相去豈

不遠耶

還少丹 大補心腎脾胃一切虛損神志俱耗筋力

頓衰腰脚沈重肢體倦怠血氣羸乏小便渾濁

乾山藥 牛膝酒浸 遠志去心 山茱萸去核 白茯苓去皮 五

味子 巴戟酒浸 肉苁蓉酒浸 石菖蒲 楮實

杜仲去麤皮薑汁酒拌同炒斷絲 舶茴香各一兩 枸杞子 熟地

黃各二兩

此據寶鑑所定考楊氏原方山藥牛膝各一兩半
茯苓茱萸楮實杜仲五味巴戟苁蓉遠志茴香各

一兩 菖蒲 地黃

枸杞 各半兩

右為細末煉蜜同棗肉為丸如桐子大每服三十九
溫酒或鹽湯下日三服食前五日覺有力十日精神
爽半月氣壯二十日目明一月夜思飲食冬月手足
常暖久服令人身體輕健筋骨壯盛悅澤難老更看
體候加減如熱加山梔仁一兩心氣不寧加麥門冬一兩
少精神加五味子一兩陽弱加續斷一兩常服固齒無瘡
瘡婦人服之容顏悅澤煖子宮去一切病

按楊氏製此方緩補心腎脾肺正合內經勞者溫之損者溫之之義溫養和平以俟虛羸之自復耳虛勞纔見端者宜之若病勢已成此方又迂緩不切矣大約中年無病男女服之必効方名還少丹意可知也人參養榮湯 治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉等證若氣血虛而變見諸證勿論其病勿論其脈但用此湯其病悉退

白芍藥

一錢五分

人參

陳皮

黃芪

蜜炙

桂心

當歸

白朮

甘草

炙各一錢

熟地黃

五味子

炒杵

茯苓

各七

分半 遠志

去心五分

右薑棗水煎服

按方中諸品為心脾二臟之藥於補肺殊不甚切然
養榮之法正當補養心脾以榮為水穀之精氣脾得
以主之及行至上焦則肺衛心榮各分氣血所主固
知養榮原不及於肺方下所註肺虛誤也昌因養榮
之義關於虛勞最切故辨之

參朮膏

治中風虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗

傷元氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈

人參

白朮

各等分

右水煎稠湯化服之

按方下所治非為虛勞設也而治虛勞尤在所必用
藥品精貴功效敏速莫踰於此後人增以仁蓮肉黃
芪茯苓神麴澤瀉甘草七味吾不知於補元氣之義
何居而鄙吝之人見之未有不欣然從事者矣

人參散 治邪熱客經絡痰嗽煩熱頭目昏痛盜汗
倦怠一切血熱虛勞

黃芩

半兩

人參

白朮

茯苓

赤芍藥

半夏麴

柴胡

甘草

當歸

乾葛

各一兩

每服三錢水一盞薑四片棗二枚煎七分不拘時溫
服

按此方治邪熱淺在經絡未深入臟腑雖用柴胡乾
葛之輕全藉參朮之力以達其邪又恐邪入痰隧用

茯苓半夏兼動其痰合之當歸赤芍黃芩并治其血中之熱且止用三錢為劑蓋方成知約庶幾敢用柴胡乾葛耳此許叔微之方一種深心昌故發之

保真湯 治勞證體虛骨蒸服之清補

當歸 生地黃 熟地黃 黃芪

蜜水炙

人參 白

朮 甘草 白茯苓

各五分

天門冬

去心

麥門冬

去心

芍藥 黃蘗

鹽水炒

知母 五味子 軟柴胡 地

骨皮 陳皮

各一錢

蓮心

五分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

按此方一十八味十全大補方中已用其九獨不用肉桂耳然增益地黃代川芎之上竄尤為合宜餘用黃蘗知母五味子滋益腎水二冬地皮清補其肺柴胡入肝清熱陳皮助脾行滯全重天冬麥冬黃柏知母五味地皮柴胡不獲已借十全大補以行之耳其意中實不欲大補也然亦一法錄之

三才封髓丹 降心火益腎水滋陰養血潤補不燥

天門冬

去心

熟地黄

人參

各半兩

黃蘗

三兩

砂仁

一兩半

甘草

七錢半炙

右六味為末麵糊丸桐子大每服五十丸用從蓉半兩切作片酒一盞浸一宿次日煎三四沸去滓空心食前送下

按此於三才丸方內加黃蘗砂仁甘草以黃蘗入腎滋陰以砂仁入脾行滯而以甘草少變天冬黃蘗之苦俾合人參建立中氣以伸參兩之權殊非好為增

益成方之比故錄用之

天真丸 治一切亡血過多形槁肢羸食飲不進腸

胃滑泄津液枯竭久服生血養氣暖胃駐顏

精羊肉

七斤去筋膜脂皮披開入藥末

肉苁蓉

十兩

當歸

十二兩洗去蘆

山

藥

濕者去皮十兩

天門冬

去心焙乾一斤

右四味為末安羊肉內裹縛用無灰酒四瓶煮令酒

盡再入水二升煮候肉糜爛再入

黃耆末

五兩

人參末

三兩

白朮末

二兩

熟糯米飯焙乾作餅將前後藥末和丸梧子大一日
二次服三百丸溫酒下如難丸用蒸餅五七枚焙乾
入臼中杵千下丸之

按此方可謂長於用補矣人參羊肉同功而從蓉山
藥為男子佳珍合之當歸養榮黃耆益衛天冬保肺
白朮健脾而其法製甚精允為補方之首

麥煎散 治少男室女骨蒸黃瘦口臭肌熱盜汗婦
人風血攻症四肢

赤茯苓

當歸

乾漆

鼈甲

醋炙

常山

大黃

煨

柴胡

白朮

生地黃

石膏

各一兩

甘草

半兩

右為末每服三錢小麥五十粒水煎食後臨卧服若

有虛汗加麻黃根一兩

按此方治肝肺脾胃火盛灼乾營血乃致口臭肌熱
可驗故用潤血行瘀之法以小麥煎之引入胃中蓋
胃之血乾熱熾大腸必然枯燥服此固可無疑然更
加人參助胃真氣庶可多服取効也

人參地骨皮散 治臟中積冷營中熱按之不足舉
之有餘陰不足而陽有餘也

茯苓

半兩 知母

石膏

各一兩

地骨皮

人參

柴胡

生地黃

各一兩
五錢

右㕮咀每服一兩生薑三片棗一枚水煎細細溫服
間服生精補虛地黃丸

按臟中積冷營中熱冷熱各偏為害不一此方但可
治營熱耳於臟冷無預也方後云間服生精補血地

黃丸豈一方中不當兩涉耶又豈以治營熱為最急
無暇分功於臟冷耶如法用之俟營熱稍清兼治臟
冷要亦用藥之小權衡耳

東垣補中益氣湯

黃芪

一錢五分

人參

甘草

炙各一錢

白朮

當歸身

柴

胡升麻 陳皮

各五分

右咬咀水煎

益胃升陽湯

前方加

炒麵

一錢五分

生黃芩

濕盛暑之伏庚金肺逆
每服少許秋涼去之

右咬咀水煎

丹谿大補丸

黃栢

炒褐色

知母

酒浸炒各四兩

熟地黃

酒蒸

敗龜板

酥炙黃為末各

六兩

右為末豬脊髓和煉蜜丸如桐子大每七十九空心

淡鹽湯送下

補陰丸

黃栢

半斤鹽酒炒

知母

酒浸炒

熟地黄

各三兩

敗龜板

酒浸四兩

炒

白芍

炒

陳皮

牛膝

各二兩

瑣陽

當歸

各一兩半

虎

骨

一兩酒浸酥炙

右為末酒煮羊肉丸如桐子大每五六十丸鹽湯下

冬加乾薑半兩

嚴氏芪附湯

治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃芪

蜜炙附子

炮等分

為咀每四錢加生薑煎

參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短頭

暈

人參

半兩

附子

炮去皮
臍一兩

為咀分作三服加生薑煎

水腫門諸方

金匱防己黃芪湯

防己

一兩

黃芪

一分

白朮

三分

甘草

半兩

右剉每服五錢七生薑四片棗一枚水盞半煎取八

分去滓溫服良久再服

金匱越婢湯

麻黃

兩六

石膏

斤半

生薑

兩三

大棗

枚十五

甘草

兩二

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三

升分溫三服惡風者加附子一枚風水加朮四

兩

古今錄驗

金匱防己茯苓湯

防己

兩三

黃芪

兩一

桂枝

兩三

茯苓

兩六

甘草

兩二

右五味以水六升煮取二升分溫三服

金匱麻黃附子湯

麻黃

三兩

甘草

二兩

附子

一枚炮

右三味以水七升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升半溫服八合日三服

金匱杏子湯

未見恐是麻黃杏子甘草石膏湯

蒲灰散

方見消渴門

金匱黃芪芍藥桂枝苦酒湯

黃芪

五兩

芍藥

三兩

桂枝

三兩

右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升温服一

升當心煩服至六七日乃解苦心煩不止者以苦酒

阻故也

一方用美酒
醱代苦酒

金匱桂枝加黃芪湯

桂枝

芍藥

生薑

各三兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

黃芪

二兩

右六味以水一斗煮取三升温服一升須臾飲熱稀

粥一升餘以助藥力溫覆取微汗若不汗更服

金匱桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

桂枝

生薑

各三兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

麻黃

細辛

各二兩

附子

一枚炮

右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升分溫三服當汗出如蟲行皮中即愈

金匱枳朮湯

枳朮

七枚

白朮

二兩

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中脹即當散也

實脾散 治陰水發腫用此先實脾土

厚朴

去皮薑製

白朮

木瓜

去穢

大腹子

附子

炮

木香

不見火

草薢仁

白茯苓

去皮

乾薑

炮各一兩

甘草

炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎七分不拘時溫服

按治水以實土為先務不但陰水為然方下所云治

陰水發腫用此先實脾土然則其後將用何藥耶儼然陰水當補陽水當瀉之念橫於胸中故其言有不達耳夫陰水者少陰腎中之真陽衰微北方之水不能蟄封收藏而泛溢無制耳倘腎氣不溫則真陽有減頂之凶矣實土以堤水寧不為第二義乎方中不用桂而用厚朴枳榔尚有可議耳

復元丹 治脾腎俱虛發為水腫四肢虛浮心腹腎脹小便不通兩目下腫

附子

炮二兩

南木香

煨

茴香

炒

川椒

炒出汗

厚朴

去粗皮蘆

製

獨活

白朮

炒

陳皮

去白

吳茱萸

炒

桂心

各一兩

澤

瀉

一兩半

肉苳蔻

煨

栝榔

各半兩

右為細末糊丸如梧桐子大每服五十九不拘時紫

蘇湯送下

按此方合前方俱主脾腎之治而此方溫煖腎臟之藥居多較前方稍勝然不用茯苓仍用栝榔厚朴終落時套耳

導滯通幽湯 治脾濕有餘及氣不宣通面目手足

浮腫

木香 白朮 桑白皮 陳皮

各五錢

茯苓

去皮一兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服空心食前

按脾喜燥惡濕脾濕有餘氣不宣通即是脾中健運之陽不足先加意理脾之陽俟體中稍快用此方退其面目手足浮腫乃為善也

胃苓湯 乃平胃散合五苓散加陳皮也

蒼朮

厚朴

薑汁炒

陳皮

白朮

茯苓

各一錢半

澤瀉

猪苓

各一錢

甘草

六分

官桂

三分

右水加生薑煎服

按此方宣導胃水膀胱水順道而出水患在所必用然亦相其人津液不虧腎水不竭乃可用之恐蹈重虛之律也其遠人無病但覺不服水土允宜此方消風敗毒散 此即人參敗毒散合荆防敗毒散並

用也

人參

獨活

柴胡

桔梗

枳殼

麩炒

羌活

茯苓

苓

川芎

前胡

甘草

荊芥

防風

各一錢

水二鍾薑三片煎八分食遠服

按此方治風水皮水凡在表宜從汗解者必用之劑然仲景之用汗法必兼用黃芪實表恐表虛之人因身之水乘表藥外湧盡漬皮腠反為大累耳此方用人參為君固護元氣是以用之無恐即是推之元氣

素虛腠理素疎參芪合用允為當矣

加減金匱腎氣丸 治肺腎虛腰重脚腫小便不利

或肚腹腫脹四肢浮腫或嘔急痰盛已成蠱證其
効如神此證多因脾胃虛弱治失其宜元氣後傷
而變證者非此藥不能救

白茯苓 三兩 附子 五錢 牛膝 官桂 澤瀉 車前子

山茱萸 山藥 牡丹皮 各一兩 熟地黄 四兩

搗膏

右為末和地黄煉蜜丸如桐子大每服七八十九空

心白湯下

按本方濟生以附子為君此薛新甫重訂用白茯苓為君合之牛膝車前治腰以下之水其力最大然則腎之關門不開必以附子回陽蒸動腎氣其關始開胃中積水始下以陽主開故也關開即不用茯苓牛膝車前而水亦下關闔則茯苓車前用至無算抑莫如之何矣用方者將君附子乎抑君茯苓乎

調榮散 治瘀血留滯血化為水四肢浮腫皮肉赤

紋名血分

蓬朮 川芎 當歸 延胡索 白芷 枳櫚

陳皮 赤芍藥 桑白皮炒 大腹皮 赤茯苓

葶藶炒 瞿麥各一錢 大黃半 細辛 官桂 甘草

炙各
五分

右作一服水二鍾薑三片紅棗二枚煎至一鍾食前服

按瘀血化水赤縷外現其水不去勢必不瘀之血亦

盡化為水矣此方只作一服原不欲多用之意但服後其水不行赤縷不減未可再服且用治血補氣之藥調三五日徐進此藥虛甚者必參附合用得大力者主持其間驅逐之藥始能建功也

烏鯉魚湯 治水氣四肢浮腫

烏鯉魚

一尾

赤小豆

桑白皮

白朮

陳皮

各三錢

蔥白

五莖

右用水三碗同煮不可入鹽先喫魚後服藥不拘時

侯

按此方用烏魚煖胃行水合之赤豆慈白以開鬼門
潔淨府更合之白朮陳皮桑皮清理脾肺一種深心
殊可採用

防已散 治皮水腫如褰衣在皮膚中四肢習習然

漢防已 桑白皮 黃芪 桂心 赤茯苓

各一兩

二兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服五錢水一大盞煎至五分去滓不拘時

溫服

按此即仲景金匱防已茯苓湯治皮水之方而加桑白皮也然皮水者鬱其榮衛乎太陰肺氣不宣治法金鬱者泄之桑白皮固可加然不可過泄肺氣桂心固能行水然不如桂枝之發越榮衛大凡變易仲景之方必須深心體會假如榮衛通行水道不利又當以桂心易桂枝矣此活法也

導水茯苓湯 治水腫頭面手足徧身腫如爛瓜之

狀手按而塌陷手起隨手而高突喘滿倚息不能轉側不得着牀而睡飲食不下小便秘澇溺出如割而絕少雖有而如黑豆汁者服嘔噉氣逆諸藥不効用此即愈亦嘗驗其病重之人煎此藥時要如熬阿剌吉酒相似約水一斗止取藥一盞服後小水必行時即漸添多直至小便變青白色為愈

赤茯苓

麥門冬

去心

澤瀉

白朮

各三兩

桑白皮

紫蘇

枳榔

木瓜

各一兩

大腹皮

陳皮

砂仁

木香

各七錢半

右咬咀每服半兩水二盞燈草二十五根煎至八分空心服如病重者可用藥五兩再加麥門冬二兩燈草半兩以水一斗於砂鍋內熬至一大碗再下小鉚內煎至一大盞五更空心服滓再煎服連進此三服自然利小水一日添如一日

按此方藥味甚平而其煎法則甚奇蓋得仲景百勞水之意而自出手眼者可喜可喜

已上治水病方後附治脹病方九道

人參芎歸湯

直指

治煩燥喘急虛汗厥逆小便赤大便

黑名血脹

人參

辣桂

去粗皮

五靈脂

炒各二錢五分

烏藥

蓬朮

煨

木香

砂仁

炙甘草

各半兩

川芎

當歸

半夏

湯炮各七錢五分

右咬咀每服一兩五錢生薑五片紅棗二枚紫蘇四

葉煎空心服

按此方治血脹初成者服之必効

化滯調中湯

白朮

一錢五分

人參

白茯苓

陳皮

厚朴

薑製

山楂

肉

半夏

各一錢

神麴

炒

麥芽

各八分

砂仁

七分

水二鍾薑三片煎八分食前服

按此方即參朮健脾湯加神麴麥芽脹甚者加蘿蔔子炒一錢麵食傷尤宜用乃助脾之健運以消其氣分之脹也

人參丸 治經脈不利化為水流走四肢悉皆腫滿
名曰血分其候與水相類若作水治之非也宜用
此

人參 當歸

大黃

濕紙裹飯上蒸
熟去紙切炒

桂心

瞿麥

穗 赤芍藥

白茯苓

各半兩

葶藶

炒另研
一錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服十五丸加至三十
丸空心飲湯下

按此方治血分之水少用葶藶為使不至耗氣散氣

殊可取用

見睨丸

寶鑑

治寒氣客於下焦血氣閉塞而成瘕聚腹

中堅大久不消者

附子

炮去皮
臍四錢

鬼箭羽

紫石英

各三錢

澤瀉

肉桂

玄胡索

木香

各二錢

枳榔

二錢半

血竭

一錢半
另研

水

蛭

一錢炒
烟盡

京三稜

五錢
剉

桃仁

三十粒湯浸去
皮尖麩炒研

大黃

二錢剉用酒同

三稜浸一宿焙

右十三味除血竭桃仁外同為末入另研二味和勻

用元浸藥酒打糊丸如桐子大每服三十丸淡醋湯送下食前溫酒亦得

按此方消瘀之力頗大用得宜亦不為峻

小溫中丸

丹溪

治脹是脾虛不能運化不可下之

陳皮

半夏

湯炮去
皮臍

神麴

炒

茯苓

各一
兩

白朮

二
兩香

附子

不要
烘晒

針砂

各一兩半
醋炒紅

苦參

炒

黃連

炒各
半兩

甘草

三錢

右為末醋水各一盞打糊為丸如桐子大每服七八

十九白朮六錢陳皮一錢生薑一片煎湯吞下虛甚
加人參一錢各用本方去黃連加厚朴半兩忌口病
輕者服此丸六七兩小便長病甚服一斤小便始長
按脾虛作脹最不宜用大黃之藥散其脾氣丹谿此
方亦可取用

禹餘糧丸

三田

治十腫水氣脚膝腫上氣喘急小便不

利但是水氣悉皆主之

許學士及丹谿皆云此方治膨脹之要藥

蛇含石

大者三兩以新鐵鉋盛入炭火中燒蛇黃與鉋子一般紅用鉋取蛇黃傾入醋中候

冷取出

研極細

禹餘糧石

三兩

真針砂

五兩先以水淘淨炒乾入餘糧一處用米

醋二升就銚內煮醋乾為度後用銚并藥入

炭中燒紅鉗出傾藥淨磚地上候冷研細

以三物為主其次量人虛實入下項

治水多是取轉推此方三物既

非大戰甘遂芫花之比又有下項藥扶持故虛人老人亦可服

羌活

木香

茯苓

川芎

牛膝

酒浸

桂心

白

豆蔻

炮

大茴香

炒

蓬朮

附子

炮

乾薑

炮

青皮

京三稜

炮

白蒺藜

當歸

酒浸一宿各半

右為末入前藥拌勻以湯浸蒸餅揆去水和藥再杵

極勻丸如桐子大食前溫酒白湯送下三十丸至五十丸最忌鹽一毫不可入口否則發疾愈甚但試服藥即於小便內旋去不動臟腑病去日日三服兼以溫和調補氣血藥助之真神方也

按此方昔人用之屢効以其大能煖水臟也服此丸更以調補氣血藥助之不為峻也

導氣丸 治諸痞塞關格不通腹脹如鼓大便結秘小腸腎氣等疾功效尤速

青皮

用水蛭等分同

莪朮

用蜚蠊等分同

胡椒

茴香

炒去

三稜

乾漆炒

檳榔

斑貓炒

赤芍

川椒炒

乾薑

茴香

去

乾漆

去

斑貓

去

川椒

乾薑

硃砂炒

附子

青鹽炒

茺蔚

牽牛炒

石菖蒲

桃仁炒

去硃砂

去青鹽

去牽牛

去桃仁

右各等分剉碎與所製藥炒熟去水蛭等不用祇以青皮等十味為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸加至七十丸空心用紫蘇湯送下

按此方各味俱用峻藥同炒取其氣而不取其質消堅破結亦能斬關而入然病久憊甚用之必不能勝

病勢已成元氣可耐蚤用可以建功

溫胃湯 治憂思聚結脾肺氣凝陽不能正大腸與

胃氣不平脹滿上衝欬食不下脈虛而緊瀉

附子

炮去皮臍

厚朴

去皮生用

當歸

白芍藥

人參 甘

草

炙

橘皮

各一錢半

乾薑

一錢一分

川椒

去閉口炒出汗三分

右作一服水二鍾薑三片煎至一鍾食前服

按此方變附子理中之意而加血分藥兼理其下亦

可取用

強中湯 治食啖生冷過飲寒漿有傷脾胃遂成脹

滿有妨飲食甚則腹痛

人參

青皮

去白

陳皮

去白

丁香

各二錢

白朮

半

附子

錢

炮去
皮臍

草薢仁

乾薑

炮各一錢

厚朴

薑製

甘草

炙各五分

嘔加半夏傷麵加茱萸子

水二鍾薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

按此方即用附子理中湯更加香燥之藥以強其胃
胃氣虛寒者亦可暫用一二劑也

黃痺門諸方

金匱桂枝黃芪湯

方見水腫門

金匱小柴胡湯

方見嘔吐門

金匱瓜蒂散

方見三氣門

金匱小建中湯

方見虛勞門

金匱小半夏湯

方見消渴門
方論俱見前

金匱大黃硝石湯

大黃 黃蘗 硝石

各四兩

梔子

十五枚

右四味以水六升煮取二升去滓內硝更煮取一升頓服

金匱梔子大黃湯

梔子

十四枚

大黃

一斤

枳實

五枚

豉

一升

四味以水六升煮取二升分溫三服

金匱茵陳蒿湯

三方合論見前

茵陳蒿

六兩

梔子

十四枚

大黃

二兩

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三

升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤
一宿腹減黃從小便去也

按黃痺宜下之證頗多如酒痺腹滿鼻煤脈沈弦者
宜先下之如病痺以火劫其汗兩熱合蒸其濕一身
盡發熱面黃肚熱熱在裏當下之前一方大黃硝石
湯治痺病邪熱內結并膀胱俱結之重劑中一方治
酒熱內結且并肌表俱受熱結之下劑末一方治穀
痺痰熱在裏似表實非表熱之下劑學者比而參之

其用下之權宜始得了然胸中也

金匱茵陳五苓散

潤氣分燥熱

茵陳蒿末

十分

五苓散

五分方見痰飲

右二味和勻先食飲方寸匙日三服

金匱猪膏髮煎

潤血分燥熱

猪膏

半斤亂髮

如雞子大三枚

右二味和膏中煎之髮消藥成分再服

病從小便出

按二方一治氣分之燥一治血分之燥方論見前

硝石礬石散

治女勞瘵

硝石 礬石

燒等分

麻黃醇酒湯

治黃瘵表實

麻黃

三兩

右一味以美清酒五升煮取二升半頓服盡冬月用

酒春月用水煮之

茵陳附子乾薑甘草湯

治陰黃一名茵陳四逆湯

治發黃脈沈細遲肢體逆冷腰以上自汗

茵陳

二兩

乾薑

炮一兩半

附子

一枚切

甘草

炙一兩

右為粗末分作四貼水煎服

小茵陳湯

治發黃脈沈細遲四肢及遍身冷

茵陳

二兩

附子

一枚切

甘草

炙一兩

右為粗末用水二升煮一升溫分三服

茵陳附子湯 治服四逆湯身冷汗不止者

茵陳

一兩半

附子

二枚各切

乾薑

炮一兩半

右為粗末水煎分三服

茵陳茱萸湯 治服茵陳附子湯證未退及脈伏者

吳茱萸

一兩

當歸

三分

附子

二枚

各切

木通

一兩

乾薑

炮

茵陳

各一兩半

右為粗末分作二服水煎

韓氏茵陳橘皮湯 治身黃脈沈細數身熱而手足

寒喘嘔煩燥不渴者

茵陳 橘皮 生薑

各一兩

白朮

一分

半夏

半

茯苓

各半

兩

右為末水四升煮取二升放溫分作四服

按此係足太陰證少兼足陽明耳

韓氏茵陳茯苓湯

治發黃脈沈細數四肢冷小便濇煩燥而渴

茯苓

桂枝

猪苓

各一兩

滑石

一兩半

茵陳

一兩

右為末每服半兩水煎服如脈未出加當歸

麻黃連翹赤小豆湯

治身熱不去瘀熱在裏發黃小便微利

麻黃 連翹

各一兩

赤小豆

一合

右㕮咀作一服水煎

抵當湯

治太陽傷寒頭痛身熱法當汗解反利小

便熱瘀膀胱則身黃脈沈少腹硬小便自利其人

如狂者下焦有血也宜此湯主之

水蛭

蜜蟲

各十箇

大黃

一兩

桃仁

十二箇

右剉作一服水煎食前服輕者用桃仁承氣湯

按麻黃連翹赤小豆方乃仲景治傷寒發黃熱瘀在

表之方也此方乃仲景治傷寒發黃熱瘀在裏血畜下焦之方也採而錄之者見雜證當比類而思治儻因同脈同證同則用當而通神矣

半夏湯 治酒痺身黃無熱清言了了腹滿欲嘔心煩足熱或癥瘕心中懊懣其脈沈弦或緊細

半夏 茯苓 白朮 各三兩 前胡 枳殼 炒 甘草

大戟 炒各三兩 黃芩 茵陳 當歸 各一兩

右咬咀每服四錢水煎入薑三片空心服

按金匱云酒黃瘰者或酒無熱清言了了腹滿欲吐
鼻燥其脈浮者先吐之沈弦者先下之誨人察脈辨
證而用治得其先務其指已明不必出方也後人模
倣為此一方揉入他證他脈真同說夢

藿脾飲

戴氏

治酒瘰

藿香葉

枇杷葉

去毛

桑白皮

陳橘皮

乾葛

白茯苓

雞距子

各等分

右水煎下酒煮黃連丸

梔子大黃湯 治酒痺心中懊懣或熱痛

山梔

十四枚

大黃

一枚

枳實

五枚

豆豉

一升

右四味以水六升煎取二升分溫三服

白朮湯

三因

治酒痺因下後變為黑痺目青面黑心中

如啖蒜齏狀大便黑皮膚不仁脈微而數

白朮

桂心

各一錢

枳實

麩炒

豆豉

甘葛

杏仁

甘草

炙五分

水一鍾煎至七分食前服

按陳無擇做金匱酒痺下之久久為黑痺全文而製

此方祇從酒熱起見漫不識其來意詎知榮衛之氣
以久下而陷不易升布乃至索然不運於周身而周
身之血亦瘀黯而變黑色是必先復其營衛之氣隨
聽營衛運退其瘀黯然後為可無擇賢者且不深究
厥旨他何望耶

酒煮黃連丸

治酒痺

見三氣門

加味四君子湯

治色痺

人參 白朮 白茯苓 白芍藥 黃芪炙 白扁

豆

炒各三錢

甘草

炙一錢

水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾服無時

腎痺湯 治腎痺目黃渾身金色小便赤澀

升麻根

半兩

蒼朮

防風根

獨活根

白朮柴

胡根

羌活根

葛根

各半錢

白茯苓

猪苓澤

瀉

甘草根

各三分

黃蘗

二分

人參

神麴

各六分

分作二貼水煎食前稍熱服

按東垣之製此方無非欲解散腎臟之瘀熱傳出膀胱

膀胱之府俾得表裏分消耳究竟所用表藥之根終是體輕無力不能深入更不能透瘀熱堅壘雖有深心亦不過無可奈何之方而已醫而不從事仲景能免面牆而立乎

小兔絲子丸 治女勞瘵 治腎氣虛損五勞七傷

少腹拘急四肢酸疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿脚膝痿緩小

便滑數房室不舉股內濕癢水道澁痛小便出血
時有遺瀝並宜服之久服填骨髓續絕傷補五臟
去萬病明視聽益顏色輕身延年聰耳明目

石連肉

二兩

白茯苓

蒸一兩

兔絲子

酒浸研五兩

懷山藥

二兩

小半

打糊

右為細末用山藥糊搜和為丸如梧子大每服五十
丸溫酒或鹽湯下空心服如脚膝無力木瓜湯下晚
食前再服

按後人製方方下必誇大其辭令用者欣然樂從似此一方立於無過之地洋洋盈耳何不可耶

崔氏八味丸

治女勞瘵

方見二卷中寒門

滑石散

治女勞瘵

詳辨其訛宜合前論細閱

滑石

一兩半

白礬

一兩枯

右為細末每服二錢用大麥粥清食前調服以小便出黃水為度

按此方即金匱硝石礬石散也後人不解用硝石之

意狂瞽輕變其藥並變方名前有顓論論之矣茲再托出金匱製方與義相與明之蓋少陰主內一身精血悉屬主管血雖化於脾生於心藏於肝苟少陰腎之主內者病則脾莫得而化血心莫得而主血肝莫得而藏血營衛之運行稽遲克身之血液敗結乃至為乾血勞為女勞瘵向非亟去其敗結新血不生將其人亦不生矣原方取用硝石鹹寒壯水之主以驅滌腸胃瘀壅之濕熱推陳致新合之礬石能除固熱

之在骨髓者並建消瘀除濁之偉績以大麥粥為使
引入腸胃俾瘀血分從二陰之竅而出大便屬陰其
色黑小便屬陽其色黃可互驗也後之無識者更硝
石為滑石但取小便色黃為驗並不問大便之色黑
疎陋極矣陳無擇從諛其說擬議於二方之間門外
之漢不足責也古今之以小成自狃者獨一無擇乎
哉

茯苓滲濕湯 治黃痺寒熱嘔吐渴欲飲水身體面

目俱黃小便不利全不食不得卧

茵陳

七分

白茯苓

六分

木猪苓

澤瀉

白朮

陳皮

蒼朮

米泔浸一宿咀炒

黃連

各五分

山梔

炒

秦艽

防己

葛根

各四分

水二鍾煎七分食前服

按方下諸證俱係邪熱壅盛於胃雖全不食似虛實非虛也故可用之散邪解熱

參朮健脾湯 治發黃日久脾胃虛弱飲食少思

人參

白朮

錢各一

白茯苓

陳皮

白芍藥

煨當

歸

錢各一

炙甘草

錢七

水二鍾棗二枚煎八分食前

服色瘕加炙黃芪白扁豆

錢各一

按此一方為中氣虛弱而設故不治其瘕但補其中較前一方天淵故兩備酌用

當歸秦朮散

治五瘕口淡咽乾倦怠發熱微寒

白朮

茯苓

秦朮

當歸

川芎

芍藥

熟

地黃

酒蒸

陳皮

錢各一

半夏麴

炙甘草

錢各五

水二

鍾薑三片煎八分食前服濟生有肉桂小草名秦
尤飲子

按此一方血虛熱入血分又非前中虛可用補氣之
比并錄以備酌用其虛勞證叅養榮湯用之

黃連散 治黃瘡大小便秘瀉壅熱累効

黃連

二兩

大黃

二兩 醋炒

黃芩

甘草

各一兩 炙

右為極細末食後溫水調下二錢日三服先用瓜蒂
散搐鼻取下黃水却服此藥

按田野麤蠻之人多有實證可用此藥若膏粱輩縱有實熱此方亦未可用當以為戒

茵陳附子乾薑湯 治陰黃

附子

炮去皮
三錢

乾薑

炮二錢

茵陳

一錢二分

草豈蔻

煨一錢

白

朮

四分
枳實
炒麴

半夏

製
澤瀉

各五分

白茯苓

橘紅

各三分

分

生薑五片水煎去滓涼服

按此方治服寒涼藥過多變陰黃者

秦朮湯 治陰黃不欲聞人言小便不利

秦艽

兩

旋覆花

赤茯苓

炙甘草

各五錢

右㕮咀每服四錢匕以牛乳汁一盞煎至六分去滓不拘時溫服

按此一方治胃中津虛亡陽而發陰黃者其證較前方所主之證迥別故兩錄之以備酌用然此證其脈必微弱伏結亡陽者亡津液也

治陰黃汗染衣涕唾黃

用蔓青子搗末平旦以井華水服一匙日再加至兩

匙以知為度每夜小便中浸少許帛子各書記日色
漸退白則瘥不過五升而愈

按此方退陰黃之不涉虛者平中之奇

一清飲 治瘧證發熱

柴胡

三錢

赤茯苓

二錢

桑白皮

炒

川芎

各一錢

甘草

炙一錢

水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾食前服

按此一方治肝血肺氣交熱之證輕劑可退熱也

青龍散 治風氣傳化腹內瘀結而目黃風氣不得

泄為熱中煩渴引飲

地黃

仙靈脾

防風

各二錢半

荊芥穗

一兩

何首烏

去黑

皮米泔浸一宿

竹刀切二錢半

右為末每日三服食後沸湯調下一錢

按風氣發黃病在營衛之間者方宜倣此

小柴胡加梔子湯 治邪熱留半表半裏而發黃者

仍以和其表裏為法雖雜證不能外也

柴胡

半斤

黃芩

三兩

人參

三兩

甘草

三兩

半夏

半斤


生薑

三兩

大

棗十三枚 梔子三十枚

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升
溫服一升日三服



醫門法律卷十一